n.° 15.

Extrait
du rapport des memoires
et observations envoyées a l'Academie
de chirurgie sur les maladies du genou.

3.eme partie. ~~onze~~ treize numeros. *

* ces ~~onze~~ treize numeros sont depuis le 16.e jusques et compris le n.° 28.

~~tumeurs~~, hydropisie de l'articles, ankylose, abcès. &c. — par M. Sue secretaire par interim.

n.° 16. observation de M. Bourdon sur une tumeur au genou a la suite d'une chute sur cette partie qui occasionna une fracture incomplette de la partie inferieure du femur. M. Bourdon fit l'amputation, et le malade guerit en moins de trois mois. il fit disequer le genou amputé, et on trouva que les aponevroses des muscles extenseurs de la jambe etoient devenues tres epaisses et dures et calleuses; une ouverture faite a la partie laterale interne du genou donna issue à beaucoup de pus sanguinolent. la partie inferieure du femur depuis l'attache du ligament capsulaire jusqu'à trois travers de doigts au dessus des condyles etoit depouillée de son perioste, et la substance de l'os avoit perdu dans toute cette etendue un tiers de son volume, qui etoit borné par en haut par une exostose circulaire en forme de bourrelet. le condyle interne etoit separé du corps de l'os de près de quatre lignes; le ligament capsulaire etoit detaché, et un des ligamens croisés detruit. M. Bourdon pense que cette carie a été la suite de l'effort que fit le blessé pour ne pas tomber, effort dont toute la violence s'est portée sur le condyle interne du femur et qui a été assez forte pour le separer du corps de l'os, que la maladie n'ayant pas été primitivement connue, il en est resulté par le defaut de reduction et par l'absence du repos de la partie un epanchement de sucs entre le perioste et la substance de l'os. M. Bourdon croit que ce sont les sels du suc nourricier qui ont grossi et durci les aponevroses. — — —

n.° 17. un abcès survenu au genou droit d'une petite fille agée de quatre ans est le sujet du second numero par M. Lafargue chirurgien à Bayonne. le sujet de cet abcès ~~[illegible]~~

ACADÉMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 41
n° 107

etoit dans l'articulation ; on ouvrit la capsule, on introduisit un doigt, on porta des Etuvées chaudes et on fit une contre ouverture à la partie interne du genou. on setira [?] par ces ouvertures et les injections d'eau de lavage nettoyerent totalement l'abcès, et l'enfant fut guéri dans l'espace de trois mois. MM. Goursaud et Soubat rapporteurs de cette observation n'approuvent pas les opinions de l'auteur et les consequences qu'il en tire, et surtout son étonnement de ce qu'un abcès dans l'articulation du genou puisse se guérir sans l'amputation ou au moins sans Ankylose et sans fistule. — — — —

n.° 18. M. Gay eleve en chirurgie à l'armée rend compte dans une observation la cure d'une luxation totale du ligament inferieur de la rotule avec division de la capsule articulaire, suivi de la transposition de cet os jusqu'au dessus des condyles du femur, dans ce cependant que le blessé soit resté boiteux ; M. Le Chevalier rapporteur trouve que ce fait merite attention 1.° en ce qu'il est rare de voir un déplacement aussi considerable de la rotule, à la suite d'une division de son ligament, sans être suivi d'aucun accident ; 2.° en ce qu'il prouve combien peut la nature dans la réunion de ce ligament, et qu'elle force elle a cette reunion faite avec la peau et les parties adjacentes, force qui est telle qu'elle est en etat de déplacer au point fixe qui etoit immediatement fourni par une partie dure, solide et plus eloignée, telle que la tuberosité du tibia. —

n.° 19. un jeune homme de 17 ans tomba sur le genou : l'inflammation survient ; il se forme un abcès qu'on ouvre considérablement. il s'agit à huit jours après le blessé sent un tiraillement considerable dans le jarret, et au bout de quatre jours on voit le femur hors la playe de la longueur de trois à quatre pouces, et les condyles sortent avec les os de la jambe. tel est le fait envoyé à l'Academie par M. d'olhagaray chirurgien de l'hotel dieu, dans le titre d'observation d'un decollement des condyles du femur à la suite d'une chute sur le genou. M. Dufouart 2.e rapporteur de cette observation convint du decollement des condyles, mais ne croit pas qu'on

doive l'attribuer à la chute, mais bien plutôt à la division
cruciale qui a été faite de l'aponevrose et des tendons des
muscles extenseurs de la jambe, des ligamens, et de la capsule
articulaire, parceque l'articulation s'étant plus ouverte à la
partie anterieure ni aux laterales, il en est resulté une retracti[on]
ou dans les muscles flechisseurs, laquelle retraction a portant
la jambe et le talon vers la partie posterieure de la cuisse a
forcé l'extremité du femur de se detacher des epiphyses condy-
loidiennes entrainées par les os de la jambe et de sortir par
l'ouverture de la playe. ——

N.° ~~V.~~ 20. M. Michel chirurgien major du regiment
d'enghyen a envoyé deux observations sur deux malades qu'il
a gueris d'ankyloses au genou avec retraction de la jambe et
perte totale du mouvement. il a fait usage pour le premier
malade d'une machine dont il donne la description avec le
dessin. M. Sterblin rapporteur des deux observations ne
croit pas que les deux maladies que M. Michel a jugé vraies
ankyloses en presentent le caractere distinctif. il approuve
cependant les moyens employés par l'auteur pour la guerison
de ces maladies, et trouve qu'ils ont été administrés avec
toutes les connoissances de la bonne pratique. quant à la machi-
ne, il croit qu'elle a été très peu utile pour redresser la
jambe, parceque des anneaux garnis et donnés à la partie
avec le seul secours des mains peuvent suivre en pareil cas
l'office des meilleures machines. cependant cette machine pré-
sente un travail de mechanique bien imaginé pour allonger
la jambe sans comprimer les genoux. ——

N.° ~~VI.~~ 21. M. Brillouet, chirurgien du duc de
Bourbon, a envoyé une observation sur une playe contuse
du ligament inferieur de la Rotule, suivie trente ans après
de la rupture entière de ce meme ligament et du deplacement
de cet os, par une chute. un jeune homme de dix huit ans
reçut un coup de pied de cheval sur la tuberosité du tibia
et sur le ligament inferieur de la rotule, qui fut suivi
d'une playe difficile a guerir. ~~[illegible]~~ &c. le reste
de l'observation a lire. ——

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

n.° 22. ~~VII~~ c'est l'exposition par M. Dupouy de deux genoux ankylosés d'un homme dont les os qui les composent se trouvent consolidés ensemble en forme d'ankylose. à lire.

n.° 23. ~~VIII~~ memoire sur une hydropisie de l'article du genou par M. Lemerier chirurgien à Craon en bas anjou. lire le rapport de M. Chopart.

n.° 24. ~~IX~~ consultation de M. Louis sur une maladie du genou. à lire.

n.° 25. ~~X~~ tumeur enorme du genou ouverte après la mort du sujet, par M. Chauvenin m.e en chirurgie à Rambervillers en Lorraine.

n.° 26. ~~XI~~ en 1782 M. Nollerou fils m.e en chirurgie à Vitry le françois a envoyé à l'Academie un memoire sur une nouvelle methode de traiter et guerir radicalement les tumeurs blanches des articles, et particulierement celles du genou nommées fongus. cette nouvelle methode consiste à detruire le sac ou kyste de la tumeur, par les mêmes moyens qu'on emploie pour detruire celui de l'hydrocele et surtout par l'injection. des observations rapportées par l'auteur semblent confirmer l'avantage de cette methode. quoique ce memoire porte la datte de 1782, le rapport de M. Chopart qui l'approuve et trouve qu'il peut jetter des lumieres sur le traitement des maladies dont est question, porte la datte du 7 avril 1787, c'est à dire cinq ans environ après que le memoire a été envoyé.

n.° 27. ~~XII~~ c'est ~~un extrait~~ non complet d'observations sur des corps étrangers d'une nature osseuse et cartilagineuse contenus dans l'articulation du genou.

n.° 28. ~~XIII~~ tumeur au genou guérie par l'amputation de la cuisse, par M. Durand chirurgien major à Arras.